

Родительское собрание “Предупреждение суицида детей и подростков”.

По данным ООН в последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершённых самоубийств среди детей и подростков.

Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвёртое среди основных причин потенциальной потери жизни.

Причин этому несколько. Первая причина в том, что по данным статистики частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Из общего количества суицидов 90% - совершается людьми с психотическими состояниями и лишь 10% - без психотических расстройств. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное поведение подростка – это привлечение к себе внимания.

Вторая причина заключается в том, что изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, на свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности, стрессов и утраты смысла жизни.

Своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедии. По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству.

Поэтому **целями** собрания является предоставление информации:

1. Что такое суицидальное поведение, его причины среди детей и подростков.
2. Мифы, затрудняющих профилактику суицидов.
3. Дети, “группы риска”.

4. Как заметить надвигающийся суицид у своего ребенка.
5. Как предотвратить суицид ребенка (что делать и чего делать нельзя).

Итак, начнем. **Суицидальное поведение** – это проявление суицидальной активности – мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения.

При изучении суицидального поведения, следует различать следующие типы:

Демонстративное поведение. При демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще всего проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми лекарствами, изображения повешения.

Аффективное суицидальное поведение. При аффективном суицидальном поведении чаще прибегают к попыткам повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими препаратами.

Истинное суицидальное поведение. При истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению.

Наиболее распространенные **причины**, которые могут повлечь за собой совершение самоубийства подростком:

1. Состояние депрессии, вызванное потерей объекта любви, разрывом романтических отношений.
2. Чувство вины, страха, враждебности.
3. Тяжелое переживание неудач, в личных отношениях.
4. Эмоциональное, психическое или сексуальное насилие.
5. Стрессовые жизненные ситуации (серьезный разлад в семье, развод или разлука).
6. Попытки покончить с собой ранее.
7. Давление со стороны педагогов, родителей, других взрослых.
8. Давление со стороны сверстников.
9. Смерть близкого человека.
10. Потеря социального статуса в коллективе, изоляция от социального окружения.
11. Боязнь ответственности за совершенный поступок.
12. Слабо физическое развитие или приобретенный физический дефект (например, вследствие автокатастрофы).

Многие люди имеют неправильное представление о суицидентах, поэтому часто упускают момент помощи, в которой нуждается человек. Профилактику самоубийств необходимо начинать с развенчания “**мифов**”, объясняющих действия суицидентов.

МИФ	ФАКТ
Самоубийство совершается в основном психически ненормальными людьми	Большинство из самоубийц – практически здоровые люди, попавшие в острую психотравмирующую ситуацию
Самоубийство предотвратить невозможно, тот, кто решился, рано или поздно это сделает	Потребность суицидента в духовной теплоте, желание быть выслушанным, понятным определяет возможность оказания помощи
Если человек открыто сообщает о желании покончить с собой, то он никогда не совершит самоубийства	Из 10 человек, покончивших жизнь, 8 вполне определенно сообщали о своих намерениях
Если загрузить человека работой (учебой), то ему некогда будет думать о самоубийстве	Чрезмерные нагрузки могут привести к истощению организма и еще больше повлиять на вероятность суицидальной попытки
Предвидеть попытку суицида невозможно	“Заглянуть в душу” очень сложно, но такие возможности имеются
Существует такой психологический тип людей, “склонных к совершению самоубийства”	Самоубийство совершают люди различных психологических типов. Реальность суицидального намерения зависит от силы психотравмирующей ситуации и ее оценки личностью как непереносимой
Не существует признаков указывающих на то, что человек решился на самоубийство	Самоубийству предшествует необычное для данного человека поведение. Необходимо знать действия и высказывания, которые служат сигналом о готовности к суициду
Решение о самоубийстве приходит внезапно без предварительной подготовки	Суицидальный кризис может длиться несколько недель и даже месяцев в зависимости от длительности психотравматизации
Улучшение, наступающее после суицидального кризиса, означает, что угроза самоубийства прошла	Большинство самоубийств происходит в течение примерно 3 месяцев после начала “улучшения”, когда у человека появляется энергия для воплощения своих мыслей и чувств в жизнь
Если человек совершил попытку самоубийства, то он никогда этого не повторит снова	Риск повторного суицида наиболее высок в первые месяцы после неудачной попытки

Кто из детей наиболее подвержен суициду? Более всего восприимчивы к суициду следующие группы:

- Дети - суиценденты чаще лишены родительского внимания и заботы.
- Дети, у которых бывали суициды в семье
- Дети, употребляющие алкоголь.
- Дети, хронически употребляющие наркотики и токсические препараты.
- Дети с аффективными расстройствами, особенно тяжелые депрессии (психопатологические синдромы).
- Дети с хроническими или смертельными болезнями;
- Дети, испытавшие тяжелую утрату, например, смерть родителя, особенно в течение первого года после потери.
- Дети в семьях, которых серьезные семейные проблемы: уход из семьи или развод.

Как же заметить надвигающийся суицид у своего ребенка?

Признаки суицидального поведения детей:

Словесные	Поведенческие	Ситуационные
- Прямые, явные высказывания о смерти: “Я не могу так больше” - Косвенные намеки о своем намерении: “Я больше не буду ни для кого проблемой”, “Тебе больше не придется обо мне волноваться”, “Я ни кому не нужен”, “Всем будет лучше без меня” . - Жалобы на жизнь, никчемность и ненужность “Мне все надоело”, “Они пожалеют, когда я уйду” - Шутки на тему самоубийства - Нездоровая заинтересованность вопросами смерти - Размышления на тему могут приобрести художественное оформление (стихи, музыка, рисунки, иллюстрирующие депрессивное настроение) - Жалобы на физическое недомогание - Записки об уходе из жизни - Многозначительные прощания с другими людьми	- Печаль, подавленность, тревога, плачь - Потеря интереса к жизни - Беспокойство, раздражительность, угрюмость - Отсутствие мотивации к решению жизненных задач - Замкнутость - Фиксация внимания на примерах самоубийства - Нарушение межличностных отношений (сужение круга контактов в коллективе, стремление к уединению) - Утрата интереса к окружающему - То внезапная эйфория, то приступы отчаяния - Потеря или повышение аппетита, проблемы со сном - Снижение двигательной активности у людей активных подвижных и общительных - Возбужденное поведение и повышенная активность у малоподвижных и молчаливых - Перепады настроения - Необычное невнимание к внешнему виду - Потеря интереса к любимым занятиям - Нарушения внимания - Перемены в школьных	- Активная предварительная подготовка, целенаправленный поиск средств самоубийства (накопление лекарственных средств, поиск отравляющих жидкостей и т.п.) - Внезапное проявление несвойственных черт (аккуратности, откровенности, щедрости, раздача личных вещи и т.п.) - Окончательное приведение в порядок дел - Примирение с давними врагами - Отказ от совместных дел - Приобщение или сильное употребление алкоголя, наркотиков - Излишний риск в поступках - Отсутствие планов на будущее - Социальная изолированность (нет друзей) - Нестабильное окружение (серьезный кризис в семье) - Ощущает себя жертвой насилия (физического, сексуального или эмоционального)

	привычках (пропуски занятий в школе, невыполнение домашнего задания, избегание общения с одноклассниками)	
	- Высокий уровень притязаний (высокая критичность к себе и своим поступкам)	

Чтобы предотвратить суицид у ребенка, прежде всего:

1. Внимательно выслушаете решившегося на самоубийство ребенка. В состоянии душевного кризиса любому из нас необходим кто-нибудь, кто готов выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами.

2. Относитесь серьезно ко всем угрозам. Разговоров на тему самоубийства может и не быть. Любой признак возможно опасности вас должен насторожить. Внимательно отнеситесь ко всем, даже незначительным, обидам и жалобам. Подростки могут и не давать волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой депрессии.

3. Поговорите с кем-нибудь о ваших опасениях. Возможность совершения самоубийства вызывает эмоциональный стресс, поэтому вам надо избавляться от собственных тревог и получить поддержку специалиста. Пусть он решает, насколько реальны ваши опасения.

4. Постарайтесь определить, насколько серьезны намерения и чувства вашего ребенка и есть ли у него план действий. Конкретный план (в отличие от неопределенного, расплывчатого) – знак реальной опасности.

5. Не бойтесь прямо спросить, не думает ли ваш ребенок о самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать свои проблемы.

6. Дайте знать ребенку, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его безопасность.

7. Пригласите психотерапевта, который может вывести подростка из кризисного состояния. В терапевтическом процессе лечения подростки с суицидальными тенденциями достигают осознания своих проблем и вырабатывают совладающие стратегии.

8. Дайте ребенку почувствовать, что вам не все равно. Слушайте с чувством искренности и понимания. Не отталкивайте его. Если он решил разделить с вами свои проблемы, даже если вы потрясены сложившейся ситуацией, помните, что подросток с суицидальными наклонностями редко обращается за помощью к профессионалам. Убедите ребенка в том, что непременно есть такой человек, который может помочь.

9. Ненавязчиво отстаивайте свою точку зрения, что самоубийство – не эффективное решение всех проблем. Убедите ребенка в том, что, приняв вашу помощь, он сделал верный шаг.

10. Не предлагайте упрощенных решений типа: “Все, что тебе сейчас необходимо – это хорошо выспаться, утром ты почувствуешь себя лучше”. Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать, например: “Конечно, твой классный руководитель поможет”.

11. Не оставляйте своего ребенка без внимания. Если вам надо уйти, оставьте его на попечении взрослого.

12. Вас не должны ввести в заблуждение утверждения о том, что кризис уже миновал. Часто ребенок может почувствовать облегчение после разговора о самоубийстве, но вскоре опять вернется к тем же мыслям, поэтому так важно не оставлять его в одиночестве даже после успешного разговора. Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии душевного кризиса нужны строгие утвердительные указания. Осознание вашей компетентности, заинтересованности в его судьбе и готовности помочь дадут ему эмоциональную опору.

13. Не избегайте и других возможных источников помощи – друзей, семью, врачей, священников, к которым можно обратиться.

Что родителю делать нельзя, если для ребенка характерно суицидальное поведение:

1. Заметив признаки аффективного поведения (непривычные реакции, повышенную нервозность, несдержанность в поступках и словах, выраженное отчаяние), допускать негативное воздействие на ребенка – упрекать, наказывать, надсмехаться, подшучивать и т.д.

2. Пытаться выступать в роли судьи.

3. Говорить – “Посмотри на все, ради чего ты должен жить ...”.

4. Оставлять опасные предметы (лекарства, колющие, режущие предметы и др.) там, где находится подросток, собирающийся покончить жизнь.

5. Оставлять ребенка, собирающегося покончить жизнь, одного.
6. Спорить, стараться образумить ребенка, говоря: “Ты не можешь убить себя, потому что ...”.
7. Наталкивать на мысль, говоря: “Пойди и сделай это ...”.
8. Пытаться успокоить ребенка, приводя ему в качестве примера ситуации с проблемами других людей: “У тебя не произошло ничего страшного, а вот у ... на самом деле беда”.

Если вы слышите	Обязательно скажите	Не говорите
“Ненавижу школу...”	“Что происходит у нас, из-за чего ты себя так чувствуешь?”	“Когда я был в твоём возрасте... Да ты просто лентяй!”
“Все кажется так безнадежным”	“Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы и какую из них надо решить в первую очередь”	“Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе”
“Всем было бы лучше без меня!”	“Ты очень много значишь для нас, и меня беспокоит твоё настроение. Скажи, что происходит?”	“Не говори глупостей. Давай поговорим о чём-нибудь другом”
“Вы не понимаете меня!”	“Расскажи мне, как ты себя чувствуешь. Я действительно хочу знать”	“Кто может понять молодёжь в наши дни”
“Я совершил ужасный поступок”	“Давай сядем и поговорим об этом”	“Что посеешь, то и пожнешь!”
“А если у меня не получится”	“Если не получится, я буду знать, что ты сделал все возможное”	“Если не получится – значит, ты недостаточно старался!”

Действия родителей при попытке суицида

Если все же предотвратить несчастье не удалось, и ребенок все же совершил попытку суицида, родители должны принять комплекс срочных мер. Разумеется, первым вашим чувством будет испуг и облегчение от того, что жизнь ребенка все же удалось спасти. Не скрывайте свои чувства от ребенка под маской равнодушия и уж тем более гнева. Ребенок должен чувствовать, что вы очень любите его и дорожите им.

После того, как состояние здоровья ребенка стабилизируется, вам в обязательном порядке будет необходимо обратиться за помощью психологов. Ни в коем случае не пренебрегайте помощью профессионалов – зачастую справиться с проблемой своими

силами практически невозможно. В том случае, если врачи сочтут нужным поместить вашего ребенка в специализированный реабилитационный центр, ни в коем случае не отказывайтесь. Помните о том, что попытку суицида ваш ребенок совершил не просто так, а значит, он может ее повторить в том случае, если причина ее не будет выявлена и устранена.

В том же случае, если госпитализация ребенка не требуется, большая часть ответственности за реабилитацию здоровья ребенка ложится на плечи родителей. Ни в коем случае не конфликтуйте с ребенком, не обвиняйте его ни в чем. Постарайтесь понять вашего ребенка, войти в его положение и помочь ему. В том случае, если ребенок будет ощущать вашу помощь и поддержку, он наверняка не станет больше пытаться свести счеты с жизнью.



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО САМБО»**

Приказ № 41/2

о проведении областного родительского собрания
на тему: «Предупреждение суицида детей и подростков»

30.10.2024 г.

г. Иркутск

Во исполнении поручения министерства спорта Иркутской области от 21 июня 2024 года № 06-96-122/24 и в исполнение пункта 4.3 Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской области до 2025 года, утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 3 февраля 2022 года 8-рзп (далее – Межведомственный план), в соответствии с изменениями в Межведомственный план, утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 22.05.2024 года № 111-рзп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Тренерам – преподавателям отделений государственного казенного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по самбо» (далее – Учреждение) провести в срок с 1 ноября по 30 ноября 2024 года родительские собрания на тему «Предупреждение суицида детей и подростков» согласно разработанного плана проведения родительского собрания (Приложения № 1 к настоящему Приказу).

2. Заместителю директора подготовить Памятку родителям на тему «Предупреждение суицида детей и подростков» с выдержками из Приложения № 1 к настоящему Приказу и разместить вышеуказанную Памятку на официальном сайте Учреждения в разделе.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора М.Р. Бергомитскую.

Директор ГКУДО СШ по самбо

А.Г. Уколов

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора
ГКУДО СШ по самбо
«30» октября 2024 г.

М.Р. Бергомитская